



Guía de prescripción de la >

Píldora Postcoital

PILDORA POSCOITAL.



Orden del Departamento de Salud y Consumo, por la que se regula la prescripción y administración gratuita de la Píldora Postcoital en los Centros Sanitarios Públicos del Sistema de Salud de Aragón.

“.....el Departamento de Salud y Consumo ha considerado oportuno su prescripción y **ADMINISTRACIÓN GRATUITA** a través de los Centros Públicos del Sistema de Salud de Aragón que se establecen en la presente Orden, con **OBJETO** de conseguir tanto un mayor control en su utilización como una **REDUCCIÓN** en el **NÚMERO** de **EMBARAZOS** y **ABORTOS** entre las **ADOLESCENTES** y **JÓVENES** en **ARAGÓN**.....”

.

PILDORA POSCOITAL.



Orden del Departamento de Salud y Consumo, por la que se regula la prescripción y administración gratuita de la Píldora Postcoital en los Centros Sanitarios Públicos del Sistema de Salud de Aragón.

Artículo Segundo.- **CENTROS DISPENSADORES AUTORIZADOS**

Quedan autorizados para la prescripción y administración gratuita de la píldora postcoital todos los

- ***CENTROS DE SALUD.***
- ***PUNTOS de ATENCIÓN CONTINUADA DIFERENCIADOS de los CENTROS DE SALUD.***
- ***SERVICIOS de URGENCIA de los HOSPITALES GENERALES.***
- ***CENTROS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR.***

PILDORA POSCOITAL.



Orden del Departamento de Salud y Consumo, por la que se regula la prescripción y administración gratuita de la Píldora Postcoital en los Centros Sanitarios Públicos del Sistema de Salud de Aragón.

Artículo Tercero.- **PROFESIONALES AUTORIZADOS para la PRESCRIPCIÓN y ADMINISTRACIÓN.**

“La píldora postcoital se prescribirá por los **médicos adscritos a los centros dispensadores autorizados** y se administrará por profesionales sanitarios”.

PILDORA POSCOITAL.



PILDORA POSCOITAL.

ANTICONCEPCIÓN de EMERGENCIA.

INTERCEPCIÓN.

PILDORA del DÍA SIGUIENTE.

PILDORA POSCOITAL.


A photograph showing a person's feet on a bed. The feet are positioned as if they are about to be stepped on. A small, clear glass pill bottle lies on the bed near the right foot. The background is a white sheet of fabric.

Y AL DIA SIGUIENTE con la pildora poscoital

"Segunda oportunidad"

PRINCIPIO ACTIVO

“Pildora poscoital”




LEVONORGESTREL.

- Norlevo® (Chiesi España, S.A.).
- Postinor® (Schering España, S.A.).
- Envase con 2 comprimidos de 750 µg.



MECANISMO DE ACCIÓN.

“Píldora poscoital”



Inhibe la ovulación


¿Alteración transporte tubárico del óvulo?

¿Efecto luteolítico?

Cambios endometrio

EFICACIA.

“Píldora poscoital”





- ✿ Relaciones sexuales sin protección.
- ✿ Fallo del método anticonceptivo:
 - Rotura preservativo.
 - Retención preservativo.
 - Olvido de la toma de píldora.
 - Pérdida, olvido de anillo vaginal vs parche.
 - Etc.
- ✿ Agresión sexual.

CONTRAINDICACIONES.

“Píldora poscoital”



➤ Gestación.

➤ Intolerancia a los componentes.

➤ Insuficiencia hepática grave.



✘ HISTORIA CLINICA:

- ✘ Motivo de la solicitud.
- ✘ Día y hora de la relación sexual no protegida.
- ✘ Fecha de la última regla (Día del ciclo).
- ✘ Antecedentes médicos (Descartar contraindicaciones)

✘ **NO** es preciso realizar ningún tipo de exploración.

✘ Reacción de embarazo, **SOLO** si refiere retraso menstrual.

FORMA de ADMINISTRACIÓN.

Dosis única

2 comprimidos antes de las 72 horas



EFECTOS ADVERSOS.

“Píldora poscoital”



✘ **NO** produce efectos adversos mayores.

✘ **POSIBLES** efectos adversos menores:

✦ Alteración del ciclo.

✦ Intolerancia digestiva.

✦ Tensión mamaria.

✦ Cefalea.

SITUACIONES ESPECIALES.

“Píldora poscoital”



- ✘ Puede administrarse durante la lactancia.
- ✘ Interacciones con otros medicamentos.
- ✘ Lapso de tiempo superior a las 72 horas.
- ✘ Solicitud repetida en el mismo ciclo.

RECOMENDACIONES.

“Píldora poscoital”



- ✘ Advertir de los posibles efectos adversos.
- ✘ Advertir que la regla no aparecerá inmediatamente.
- ✘ Debe continuar usando preservativo.
- ✘ Recomendar que acuda al COF si se produce un retraso de la siguiente regla de más de siete días.

PRESCRIPCION a MENORES.

“Pildora poscoital”



PRESCRIPCION a MENORES.

“Píldora poscoital”



- ✘ Mayores de 16 años o menores emancipadas.**
- ✘ Menores de 12 años.**
- ✘ Mayores de 12 años y menores de 16.**

Ley de Protección Jurídica del Menor; 1/1999.
Ley Básica de Autonomía de los Pacientes; 41/2002.
Ley 6/2002 de Salud de Aragón.

Prescripción a menores.

“Píldora poscoital”



Mayores de 16 años o menores emancipadas

“No cabe prestar el consentimiento por representación”.

Art. 9,3 de la Ley Básica de Autonomía del Paciente



Menores de 12 años

“La información y la prestación del consentimiento debería siempre ser recibida y otorgada por el representante legal del menor o, en su defecto, por las personas vinculadas familiarmente o de hecho con el mismo”.

Art. 9,3 de la Ley Básica de Autonomía del Paciente



Mayores de 12 años y Menores de 16 años

“A JUICIO del FACULTATIVO”

✘ **No** cuenta con capacidad para comprender el alcance de la intervención:

“Consentimiento por parte del representante legal”.

✘ **Si** cuenta con capacidad para comprender el alcance de la intervención **“MENOR MADURO”**:

“La recepción de la información y el otorgamiento del consentimiento deberían ser llevados a cabo por el propio menor maduro”.

